

1 KENE NEDİR VE NERELERDE BULUNUR?

Kene, insan veya hayvan derisine yapışarak kanla beslenen; konakçısının vücudundan ayrıldıktan sonra da yaşamını sürdürebilen bir dış parazittir.

Konakçı dışında, yaşamlarına elverişli çevre koşulların sağlandığı yerlerde bulunabilirler. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte açık alanlarda, ormanlarda ağaç gövdelerinde, ot, çalılık diplerinde, kışın ise ahır vb. yerlerde bulunurlar.



2 HANGİ HASTALIKLARI BULAŞTIRIRLAR?

Keneler; ısırıkları konakçıda var olan hastalık etkenini tükürük yolu ile alarak daha sonra ısırıkları diğer bir canlıya bulaştırırlar. Bu bulaşma insandan insana olabildiği gibi, hayvandan insana ve hayvandan hayvana da olabilir.

Kenenin bulaştırdığı hastalıklar denilince ilk akla gelen ve ölüm oranı yüksek olan hastalık Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)'dır. Yaklaşık 30 kene türünün Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olduğu bilinmektedir.

Bunların dışında Anaplazmozis, Babesiozis, Lyme, Erlikioz, Rocky Dağları Benekli Ateşi, Tularemi, Kolorado Kene Ateşi hastalıkları da kenelerin bulaştırdığı diğer hastalıklardır. Ayrıca tükürüklerinde bulunan enzimlerle zehirlenme, alerji ve felçlere de sebep olmaktadır.



3 HASTALIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalık belirtileri en erken 12 saat olmak üzere 10 güne kadar kendini gösterebilmektedir.

İlk belirtiler; deride kızarıklık ve ısırılan bölgede şişlik olmak üzere aniden başlayan baş ağrısı, yüksek ateş, baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk, eklem ağrıları, karın ağrısı ve kusmadır. Gözlerde, yüzde, boğazda kızarıklık ve damakta kırmızı lekeler yaygın olarak görülen diğer belirtilerdir.

4 KENEDEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Yaz aylarında kene bulunma ihtimali yüksek olan çimenli bölgelerde, ormanlık alanlarda, çalı ve yaprak yığınlarının bulunduğu bölgelerde çizme benzeri koruyucu kıyafetler tercih edilmeli, mümkün değilse, çorap giyilerek kıyafet üzerine çekilmeli ve kenenin cilde temas etmesi engellenmelidir. Ayrıca bu ve benzeri yerlerden ayrılırken kişi kendi vücudunda kene kontrolü yapmalıdır. Kene ısırması sonrası kenenin yapışık kalma süresi hastalık riskini artırdığı için bu kontrol önemlidir.


Hayvancılıkla uğraşan kişiler düzenli aralıklarla ahırlarına ilaçlama yaptırmalıdır. Vücudunda kene tespit edilen hayvanların doku ve vücut sıvılarına çıplak elle temas edilmemelidir.

Hayvan barınakları, doğal yaşam alanları, rehabilitasyon merkezleri özellikle yaz aylarında sık sık ilaçlanmalıdır.

5 VÜCUTTA KENE GÖRÜLMESİ DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Kenenin ciltte yapışık olarak fark edilmesi halinde hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Kene asla çıplak elle çıkartılmaya çalışılmamalıdır. Kenenin ciltten çekilerek kopartılması veya uygun olmayan diğer yöntemlerle ciltten uzaklaştırmaya çalışılması durumunda kenenin başı koparak cilt içerisinde kalabilmekte hatta bazı araştırmalara göre bu durum kenenin tükürüğünü kusmasına sebep olduğu için hastalık bulaşma riskini artırabilmektedir.



5 SORUDA KENE ISIRMASI VE KORUNMA YOLLARI



Karekodu okutarak
broşürü bilgisayarınıza
indirebilir ve önerilerinizi
iletebilirsiniz.



İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE MESLEK HASTALIKLARI
ARAŞTIRMA MERKEZİ



İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası

Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1
Kasımpaşa/Beyoğlu



İBB
SAĞLIK

İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ